

Roche



Referencias:

1. Ponikowski P, et al. ESC Heart Fail. 2014;1(1):4-25.
2. Krumholz HM, et al. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2009;2:407-413.
3. Cowie MR, et al. Improving care for patients with acute heart failure [Internet; cited 2013]. Available from: <http://www.oxfordhealthpolicyforum.org/reports/acute-heart-failure/improving-care-for-patients-with-acute-heart-failure>.
4. Butler J, et al. Congest Heart Fail. 2012;18(5 Suppl 1):S1-S3.
5. Chioncel O, et al. Eur J Heart Fail. 2017;19:1242-1254.
6. Granger BB, et al. J Card Fail. 2022;28:1355-1361.
7. Butler J, et al. Eur J Heart Fail. 2021;23:1334-1342.
8. Greene SJ, et al. J Am Coll Cardiol. 2018;72:351-366.
9. Joseph S, et al. Eur Heart J. 2021;43:908-915.
10. Damasceno A, et al. Arch Intern Med. 2012;172:1386-1394.
11. Čerlinskaitė K, et al. ESC Heart Fail. 2021;8:2473-2484.
12. McDonagh TA, et al. Eur Heart J. 2021 Sep 21;42(36):3599-3726.
13. Komajda M, et al. Eur J Heart Fail. 2016;18(5):514-22.
14. Mebazaa A, et al. The Lancet. 2022; S0140-6736(22)02076-1.

Todas las marcas mencionadas cuentan con protección legal.

Roche

Publicado por
Roche Diagnóstica México
Productos Roche S. A. de C. V.
Cerrada de Bezares 9, Col. Lomas de Bezares C.P. 11910, México, CDMX.

No. de aviso COFEPRIS: 2315052002C01148


STR♥NG-HF
CONTEMPORARY POST-DISCHARGE MANAGEMENT IN HEART-FAILURE
(Manejo Contemporáneo Posterior al Alta en Insuficiencia Cardíaca)

Resultados primarios


Este material es para uso exclusivo
de los profesionales de la salud.

Actualmente, los pacientes con Insuficiencia Cardiaca (IC) presentan altas tasas de reingreso y mortalidad después del alta

Panorama




¿Cuáles son los retos en el manejo del tratamiento posterior a la alta?



Los resultados primarios de STRONG-HF muestran reducción significativa en todas las causas de muerte o reingresos por IC aguda

Diseño del estudio



Resultados

